

vragen theorie Hartreanimatie EHBO 2012-2013

Naam:

Tijd: 15 min.

Resultaat:

1. Noem de oorzaken van circulatie stilstand?

- ☐ a Het hartinfarct. De circulatie stilstand is een complicatie van een hartinfarct.
Een ongeval met elektriciteit
Spontaan of onbekend.
- ☐ b Het hartinfarct. De circulatie stilstand is een complicatie van een herseneninfarct.
Een ongeval met elektriciteit
Spontaan of onbekend.
- ☐ c Het hartinfarct. De circulatie stilstand is een complicatie van een hartwoelen.
Spontaan of onbekend.
Een ongeval met elektriciteit

2. Wat zijn de verschijnselen bij circulatiestilstand?

- ☐ a is bewusteloos
ziet er bleek uit
heeft geen circulatie meer.
ziet er "dood" uit
heeft soms epileptiforme trekkingen
- ☐ b is bewusteloos
ademt niet (normaal) en soms is er gasping
heeft geen bloed meer.
ziet er "dood" uit
heeft soms epileptiforme trekkingen
- ☐ c is bewusteloos
ademt niet (normaal) en soms is er gasping
heeft geen circulatie meer.
ziet er "dood" uit
heeft soms epileptiforme trekkingen

3. Hoe stelt U vast of iemand gereanimeerd moet worden?

- ☐ a U controleert het bewustzijn door het S.O. voorzichtig aan de schouders te schudden en aan te spreken.
Vraag bijvoorbeeld: "Wat er is gebeurd?"
Als er geen reactie is op aanraken en aanspreken, dan is het S.O. bewusteloos.
Trek de aandacht van iemand.
Het is van belang dat u iemands aandacht trekt. Is er iemand aanwezig, vraag hem of haar dan te blijven omdat er misschien hulp nodig is.
Als u alleen bent roept u om hulp.
U laat het bewusteloos S.O. dus niet alleen!
- ☐ b Vraag bijvoorbeeld: "Wat er is gebeurd?"
Trek de aandacht van iemand.
Het is van belang dat u iemands aandacht trekt. Is er iemand aanwezig, vraag hem of haar dan te blijven omdat er misschien hulp nodig is.
Als u alleen bent roept u om hulp.
U laat het bewusteloos S.O. dus niet alleen.
Als u alleen bent roept u om hulp.
U laat het bewusteloos S.O. dus niet alleen!
U controleert het bewustzijn door het S.O. voorzichtig aan de schouders te schudden en aan te spreken.
- ☐ c U controleert het bewustzijn door het S.O. voorzichtig aan de schouders te schudden en aan te spreken.
Vraag bijvoorbeeld: "Wat er is gebeurd?"
Als er geen reactie is op aanraken en aanspreken, dan is het S.O. bewusteloos.
Trek de aandacht van iemand.
Het is van belang dat u iemands aandacht trekt. Is er iemand aanwezig, vraag hem of haar dan te blijven omdat er misschien hulp nodig is.
Als u alleen bent regelt u hulp.
U laat het bewusteloos S.O. dus alleen!

4. Hoe controleert u de ademhaling volgens het protocol?

- ☐ a Luchtweg controleren.
Kinlift.
Voel, kijk, luister.
- ☐ b Luchtweg openen door kanteling en kinlift.
Kijk, luister, voel.
- ☐ c Luchtweg openen door kanteling en kinlift.
Luister, kijk, voel.

5. Melding naar welke instantie?

- ☐ a Huisarts, alarmcentrale, ambulance.
- ☐ b Alarmcentrale, ambulance, huisarts.
- ☐ c Ambulance huisarts, alarmcentrale.

6. Hoe gaat u verder nadat u het 1e aantal borstcompressie heeft gedaan?

- ☒ a U gaat direct terug naar het S.O. om met beademen (2) te beginnen.
- ☐ b U gaat direct terug naar het S.O. om de circulatie te controleren.
- ☐ c U begint direct met 30 borstcompressies.

7. Hoe controleert U de puls?

- ☒ a Voelt 10 sec. het S.O. zijn/haar pols.
- ☐ b Voelt het S.O. 10 sec. op de borstkast aan de zijde ervan het hart.
- ☐ c Niet

8. Waar is de juiste massageplaats op het borstbeen?

- ☒ a Met de wijs- en middelvinger van uw hand het dichtsbij de voeten van het S.O. naar de onderrand van de ribbenbogen. Plaats u wijsvinger naast de middelvinger en plaats de hiel van de andere hand op het borstbeen van bovenaf tegen uw wijsvinger.
- ☐ b Met de ring- en middelvinger van uw hand het dichtsbij de voeten van het S.O. naar de onderrand van de ribbenbogen. Plaats u wijsvinger naast de middelvinger en plaats de hiel van de andere hand op het borstbeen van bovenaf tegen uw wijsvinger.
- ☐ c Op de plaats midden op het borstbeen (hoogstepunt) waar men de maximale compressie kan uitvoeren.

9. Hoe is de juiste houding?

- ☒ a Vingers in elkaar haken.
Armen gestrekt en schuin naar beneden drukken.
2 a 3 cm. diep.
- ☐ b Vingers in elkaar haken.
Armen gestrekt en loodrecht naar beneden drukken.
ten minsten 5 maar niet meer dan 6 cm. diep.
- ☐ c Vingers in elkaar haken.
Armen gestrekt en schuin naar beneden drukken.
4 a 5 cm. diep.

10. Hoe vaak per min. wordt er gemasseerd (snelheid/tempo)?

- ☒ a ten minsten 80 p/m. maar niet meer dan 90 p/m.
- ☐ b ten minsten 90 p/m. maar niet meer dan 100 p/m.
- ☐ c ten minsten 100 p/m. maar niet meer dan 120 p/m.

11. Welke combinatie masseren/beademen is er van toepassing bij een volw.?

- ☒ a 30 hartmassage en 2 beademingen steeds afwisselen.
- ☐ b 5 hartmassage en 1 beademingen steeds afwisselen.
- ☐ c 15 hartmassage en 2 beademingen steeds afwisselen.

12. Welke combinatie masseren/beademen is er van toepassing met 2 hulpv.?

- ☒ a 30 hartmassage en 2 beademingen steeds afwisselen.
- ☐ b 5 hartmassage en 1 beademingen steeds afwisselen.
- ☐ c 15 hartmassage en 2 beademingen steeds afwisselen.

13. Wanneer gaat men over naar mond op neusbeademing?
- ☐ a Als men moe is.
 - ☐ b Als door verwondingen aan de mond de beademing onmogelijk is.
 - ☐ c Als door verwondingen aan de mond de beademing onmogelijk of onsmakelijk is.
14. Wanneer wisselt men bij reanimatie met twee hulpverleners?
- ☐ a Bij reanimatie door twee personen wordt door ieder om de beurt gedurende twee minuten alleen gewerkt.
 - ☐ b Bij reanimatie geeft men aan wanneer men moe is en men wil gaan wisselen.
 - ☐ c Bij reanimatie werkt men door tot men uitgeput is.
Pas dan wisselt men.
15. Hoe vaak controleert u de circulatie?
- ☐ a Iedere twee minuten.
 - ☐ b Iedere 5 minuten.
 - ☐ c Circulatie controle vindt niet plaats.
16. Wat is meestal de reden van het reanimeren van een baby?
- ☐ a Circulatie stilstand.
 - ☐ b Ademhalingsstilstand
 - ☐ c Hersendood
17. Bestaat er verschil in beoordeling van verminderd bewustzijn en bewustzijn?
- ☐ a Nee alleen bij flauwte.
 - ☐ b Nee, alleen bij kennis.
 - ☐ c Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen bewustzijn en bewusteloosheid.
18. De hartmassage met beademing bij een kind 1-8 jr. vindt plaats met:
- ☐ a 30 hartmassage en 2 beademingen steeds afwisselen.
 - ☐ b 5 hartmassage en 1 beademingen steeds afwisselen.
 - ☐ c 15 hartmassage en 2 beademingen steeds afwisselen.
19. Volgens het protocol voert men de hartmassage bij een kind uit:
- ☐ a alleen of met twee hulpverleners.
 - ☐ b alleen of met een hulpverlener.
 - ☐ c alleen.
20. Hoe plaats men de hand bij een kind op het borstbeen?
- ☐ a Met gestrekte armen drukt u het borstbeen een derde van de thorax in.
 - ☐ b Met gestrekte arm drukt u het borstbeen een derde van de thorax in.
 - ☐ c Met gestrekte armen drukt u het borstbeen 3 cm. van de thorax in.